Agrileader
Génération "tout compris" : qualité, conseil et prix.

Fiche technique - QUELIO FER 6 %

Fer chélaté soluble pour le traitement des chloroses ferriques des arbres fruitiers - vigne - cultures florales, ornementales et maraîchères.

Composition :

- Fer (Fe): **6% de fer soluble** dans l'eau chélaté par EDDHA **dont 4,8% ortho-ortho (soit 80% o-o)**

Description :

Toutes les plantes sont sensibles à la chlorose ferrique et en particulier la vigne, les arbres fruitiers, et les cultures ornementales. La décision de corriger cette maladie de carence lorsqu'il y a risque, doit être systématique, sinon la croissance est diminuée, la plante est plus sensible aux maladies, la qualité et le rendement sont affectés. La déficience en fer se produit en sols alcalins, ou pH élevé rendant le fer du sol insoluble, donc indisponible pour la plante.

Queliofer est un chélate de fer d'une haute pureté biologiquement actif.

Queliofer est très stable et reste disponible pour les cultures sensibles dans des sols riches en calcium. Son utilisation est particulièrement intéressante en ferti-irrigation

Queliofer grâce à sa formulation granulée est persistant tout au long de la phase végétative tout en assurant un reverdissement rapide.

Doses d'emploi et stades d'application :

- Cultures légumières : Incorporé avant le semis 2,5 à 5 kg/ha
- Poiriers - Pommiers : (juste avant le débourrement) sur jeunes arbres 10 à 25 g/arbre et sur arbres adultes 50 à 100 g/arbre
- Pêchers-Abricotiers-Kiwis : 75 à 125 g/arbre
- Vignes : juste avant le débourrement 5 à 10 g/cep
- Cultures florales et maraîchères : Avant semis ou plantation 60 g/10 m²
  Cultures ornementales (rosiers, azalées etc.) : 20 g/plant
  Ferti-irrigation : 1 kg /10 m3

Mode d'emploi : Appliquer Queliofer au niveau des racines au moyen d'un pal injecteur ou d'un coutre enfouisseur ou faire une cuvette au pied de l'arbre ou du cep. S'il ne pleut pas il est conseillé d'arroser.

Note : Vis-à-vis d'applications en sortie d'hiver avant le débourrement, Queliofer peut être employé plus tard en saison sur culture en phase de croissance mais l'arrosage et l'enfouissement sont obligatoires.